

Therapieanleitung
Stimulation mit Clomifen für gezielten Geschlechtsverkehr

1. Es wird empfohlen, 1 Tablette Folsan 0,4mg täglich einzunehmen.
2. Im Gespräch haben wir mit Ihnen eine Therapie mit Clomifentabletten für gezielten Geschlechtsverkehr vereinbart.
3. Bitte melden Sie sich einige Tage vor der erwarteten Menstruation in unserem Kinderwunschzentrum: Tel.: (06441) 200 20 20, Fax: (06441) 200 20 299
E-Mail: info@ivf-mh.de.
4. Sie erhalten dann von uns einen Stimulationspass sowie die Rezepte zugeschickt. Sehen Sie sich den Stimulationsplan genau an, und besorgen Sie bitte inzwischen die Medikamente aus der Apotheke.
5. Tragen Sie den ersten Blutungstag in Ihren Patientenpass ein und vereinbaren Sie einen Ultraschalltermin (ca. 10. Zyklustag) telefonisch mit uns.
6. Bitte nehmen Sie täglich die in Ihrem Patientenpass angegebene Dosis Clomifen-Tabletten ein.
7. Lassen Sie dann am vereinbarten Termin in unserem Kinderwunschzentrum oder evtl. auch bei Ihrem Gynäkologen eine Ultraschallkontrolle durchführen. Nehmen Sie eventuell vereinbarte weitere Ultraschalltermine wahr, bis Sie den Eisprung auslösen können.
8. Lösen Sie den Eisprung mit der vereinbarten Dosis hCG (1 Ampulle. Ovitrelle oder 2 Ampullen Predalon 5000) zur von uns vorgegebenen Zeit aus.
9. Gemeinsam mit der Uhrzeit für die Auslösung des Eisprungs werden wir Ihnen die günstigsten beiden Tage für Geschlechtsverkehr mitteilen.
10. Führen Sie bitte ca. 14 Tage nach dem gezielten Geschlechtsverkehr einen Schwangerschaftstest durch. Dafür können sie auch bei uns oder bei Ihrem Frauenarzt eine Blutentnahme vereinbaren.
11. Bei positivem Schwangerschaftstest teilen Sie uns das Ergebnis bitte mit und melden sich bei Ihrem Gynäkologen für die weitere Betreuung an.