

Therapieanleitung IVF/ICSI **Stimulation im Antagonisten-Protokoll**

1. Es wird empfohlen, 1 Tablette Folsan 0,4mg täglich einzunehmen.
2. Im Gespräch haben wir mit Ihnen eine IVF- oder ICSI-Therapie vereinbart.
3. Bitte melden Sie sich einige Tage vor der erwarteten Menstruation telefonisch bei uns:
Telefon: (06441) 200 20 20, Fax: (06441) 200 20 299,
E-Mail: Info@ivf-mh.de.
4. Sie erhalten dann von uns einen Stimulationsplan sowie die Rezepte zugeschickt. Sehen Sie sich den Stimulationsplan genau an und besorgen Sie bitte inzwischen die Medikamente aus der Apotheke.
5. Tragen Sie den ersten Blutungstag in Ihren Patientenpass ein und vereinbaren Sie einen Ultraschalltermin (ca. 6./7. Zyklustag) telefonisch mit uns.
6. Ab dem 2. Zyklustag spritzen Sie bitte einmal täglich die in Ihrem Patientenpass angegebene Menge Gonal F / Puregon / Menogon HP / Bravelle. Sie sollten diese Injektion möglichst immer zur gleichen Tageszeit geben.
7. Ab dem 7. Zyklustag nach Blutungsbeginn injizieren Sie bitte zusätzlich täglich 1 Fertigspritze Cetrotide / Orgalutran. Sie können beide Injektionen zur gleichen Tageszeit geben.
Bitte unterbrechen Sie die Stimulation keinen Tag bis zur Auslösung des Eisprungs.
8. Lassen Sie dann am vereinbarten Termin in unserem Kinderwunschzentrum eine Ultraschallkontrolle durchführen. Anhand der Ergebnisse legen wir den nächsten Kontrolltermin und die weitere Dosierung der Medikamente fest, bis Sie den Eisprung auslösen können.
9. Lösen Sie den Eisprung mit der vereinbarten Dosis hCG (1 Ampulle Ovitrelle oder 2 Ampullen Predalon 5000) zur von uns vorgegebenen Zeit aus.
10. Kommen Sie bitte mit Ihrem Partner zum vereinbarten Punktionsstag nüchtern in unser Kinderwunschzentrum und bringen Sie bitte beide die Versichertenkärtchen sowie Ihren Patientenpass mit.
11. Nach der erfolgten Follikelpunktion können Sie den 50 %igen Eigenanteil der Behandlung direkt in unserem Zentrum per EC-Karte oder auch bar bezahlen.
12. Beginnen Sie bitte nach der Follikelpunktion mit dem Einführen von Crinone (abends vor dem Schlafengehen, bis zum Schwangerschaftstest) sowie die Gabe von Predalon 1500 (gemäß des Patientenpasses).
13. Am Tag nach der Follikelpunktion erfahren Sie telefonisch das Befruchtungsergebnis von unseren Labormitarbeitern und vereinbaren den Termin für den Embryotransfer.
14. Nach dem Embryotransfer beginnen Sie bitte zusätzlich mit der Einnahme von täglich 1 Tbl. ASS 100 – bis zum Schwangerschaftstest.
15. Kommen Sie bitte 14 Tage nach dem Embryotransfer zur Blutentnahme für den Schwangerschaftstest in unserem Kinderwunschzentrum. Sie können diese Blutentnahme auch bei Ihrem Frauenarzt durchführen lassen und uns das Ergebnis mitteilen.
16. Bei negativem Schwangerschaftstest beenden Sie bitte die Einnahme von Crinone und ASS 100. Es folgt dann eine Regelblutung.
Anschließend sollte einen Monat Pause eingehalten werden.
17. Bei positivem Schwangerschaftstest nehmen Sie das Crinone bitte weiter (bis ca. 6. SSW) und vereinbaren einen Ultraschalltermin bei Ihrem Gynäkologen.